

**Nombre Común:** Búho Real

**Nombre Científico:** Bubo bubo

**Familia:** Strígidas

**Orden:** Strigiformes

**Clase:** Aves

**Protección de CLM:** Vulnerable



### **Descripción:**

La capa superior es de color pardo leonado, rayado y barrado de pardo oscuro; la garganta es blanca y el vientre leonado, ambos con marcas pardas; las "orejas" pardo oscuro; el pico negro y las patas, emplumadas, rojizas, y el iris del ojo anaranjado. La hembra es más corpulenta que el macho.

Ya en el mes de enero, la pareja desarrolla su parada nupcial para después instalar su nido en grietas o cornisas protegidas, sin aportar material. Pone de dos a cuatro huevos blancos de los que nacen otras tantas crías muy voraces, obligando a sus progenitores a realizar continuos viajes en búsqueda de alimento. Buena parte de sus restos se encuentran en los alrededores del nido

### **Alimentación:**

Su dieta alimentaría varía según las zonas, dependiendo de la abundancia, mayor o menor, de una presa determinada. Así, en ciertas zonas de Cuenca, es el erizo la presa más importante, mientras en la provincia de Ciudad Real lo es el conejo. El búho real depreda frecuentemente sobre los pollos de otras rapaces que nidifiquen en sus cercanías, como es el caso del halcón peregrino.

### **Ecosistema:**

Suele ocupar algunas zonas boscosas, aunque prefiere las "crestas" de sierras pedregosas, laderas de montes con escasa vegetación, valles encajados y umbrías.

Su población se mantiene estacionaria en las zonas apropiadas de la Región.